

雲岐子保命集論類要一



叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

雲岐子保命集論要

(一)

撰人未詳

本館據濟生拔萃
本影印初編各叢
書。僅有此本。

雲岐子保命集論類要卷上

辨脉三部九候

凡持脉須明三部九候不知者未足言詠脉之道
上部主鬲上至頭之有疾關爲中部主鬲下至臍之有疾
爲下部主臍下至足之有疾故爲三部也九候者浮詠三指
之下浮詠三候者二而成天中詠二候者三而成人沉診三
候者二而成地三而二之故爲九候此四十五動平脉法也
如二指之下浮詠得六數七極者熱實於表當瀉表宜黃湯
如浮詠得三遲二敗者爲表虛也當補其虛宜桂枝湯
如中詠得六數七極者是中焦之熱實宜調胃承氣湯瀉之
中詠得三遲二敗者中焦虛也當補之以建中湯理中湯
如沉詠得六數七極者下焦熱實以大承氣湯瀉之

沉訖得三遲二敗者下焦之虛也以姜附湯補之

麻黃爲瀉能瀉表之實不能瀉裏之實桂枝湯爲補而能補表之虛不能補裏之虛姜附爲補不能補表之虛而能補裏之虛承氣爲瀉能瀉裏之實不能瀉表之實建中之補能補中焦之虛而不能補上焦下焦之虛調胃爲瀉能瀉中焦之實而不能瀉上焦下焦之實也

辨傷寒溫病

問曰傷寒溫病何以脈辨答曰溫病冬傷於寒所得也至是變爲溫病傷寒汗下不愈而過經其證尚在而不除者亦溫病也經曰溫病之脈行在諸經不知何經之動隨其經所在而取之

如太陽證汗下後過經不愈訖得尺寸俱浮者太陽溫病也

如身熱目疼汗下後過經不愈訖得尺寸俱長者陽明溫病也
如脅脇痛汗下後過經不愈訖得尺寸俱弦少陽溫病也
如腹滿噎乾訖得尺寸俱沉細過經不愈太陰溫病也
如口燥舌乾而渴訖得尺寸俱沉過經不愈少陰溫病也
如煩滿囊縮訖得尺寸俱微緩過經不愈厥陰溫病也
是故隨其經而取之隨其證而治之如發癰乃溫毒也

刺傷寒結胃瘕氣

傷寒下後結胃瘕氣皆足三陰之終手三陰之始胃中結瘕過
在足少陰腎手厥陰包絡刺兩經之井原以瀉胃中之氣心
中結瘕過在足太陰脾手少陰心刺兩經之井原以瀉心中
之氣

胃中結瘕過在足厥陰肝手太陰肺刺兩經之井原以瀉胃

中之氣 或上中下三腕應痞結而瀉之

刺傷寒三陽頭痛

傷寒三陽頭痛何法刺之荅曰手之三陽足之三陽皆會於頭者謂諸陽之會其受邪伏留而不去故曰三陽頭痛視其色脉知在何經

如脉浮而頭痛過在足太陽刺腕骨京骨

如脉浮而長過在手陽明刺合骨衝陽

如脉浮而弦過在手足少陽刺陽池丘墟風府風池刺頭痛之法也

刺三陰腹痛

傷寒邪在三陰內不得交通故爲腹痛手足之經皆會於腹如脉弦而腹痛過在足厥陰肝手太陰肺刺太衝太淵太陵

如脉沉而腹痛過在足少陰腎手厥陰心包刺太谿太陵
如脉沉細而腹痛過在足太陰脾手少陰心刺太白神門三
陰交刺腹痛之法也

桂枝湯二十八證方一十四道

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝加厚朴杏子湯

桂枝加附子湯

桂麻各半湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝二越婢一湯

桂枝甘草湯

桂枝加桂湯

桂枝加人參湯

桂枝去桂加白朮湯

桂枝加大黃湯

桂枝湯論

尺寸俱浮太陽受病當一二日發以其脉上連風府頭項痛腰脊強太陽經始於目內眥從頭下至足終於至陰爲表之表其太陽者標熱本寒爲太陽之表表陽則熱本者膀胱之裏主水故寒脉浮爲在表故太陽經病身熱惡寒頭痛項強腰痛凡治太陽不可利小便不可妄下利小便者熱傳於裏而爲血證下之則變爲結曾此太經病所禁也若傳於本者可利小便本爲膀胱有熱小便赤澀何禁也太陽中風風傷衛衛氣虛而脉浮身熱自汗惡風宜桂枝湯補之表虛故也桂枝辛熱生姜辛溫甘草甘平大棗甘溫芍藥酸苦微寒而收實其衛氣而止汗辛甘發散風邪爲陽矣

桂枝湯

桂枝

芍藥

生姜

各參兩

甘草

貳兩

大棗

拾貳枚擘

如劉如麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服

太陽中風陽浮者寸浮也陰弱者尺弱也表虛自汗鼻鳴者肺通於鼻鼻和則聞香臭矣肺氣受邪而不通肺主衛風傷衛故鼻鳴乾嘔汗出惡寒太陽標病當補其衛汗不得外泄故使榮氣內守宜桂枝湯

太陽脈浮而弱不及平脈頭痛項強發熱汗出惡風者太陽標病故宜桂枝湯

太陽標病脈浮而長項背強者太陽也凡發熱不惡寒者陽明標病與太陽相併均宜桂枝加葛根湯

桂枝加葛根湯

桂枝

芍藥

甘草

各陸分
參八分

葛根

壹兩
貳分

生姜

壹兩

大棗

肆枚

右剉如麻豆大每服五錢煎服

太陽標中風身熱頭痛項強惡風反下後脈浮而弱自汗而喘
肺主於氣上逆而喘因下動胃氣加厚朴屬陽明上氣而逆
屬肺加杏仁故宜桂枝加厚朴杏子湯

桂枝

芍藥

生姜

各壹兩

甘草

陸分

大棗肆枚

厚朴

杏子

各加伍分

右劉如麻豆大每服五錢水二盞煎服

太陽標本病頭痛項強惡風身寒自汗脈浮而微發汗遂漏不
止小便難而清四肢急難以屈伸者太陽標與少陰本相併
故宜桂枝加附子湯

桂枝

生姜

各壹兩

大棗

叁枚

芍藥

甘草

各壹兩

附子

半枚

右劉如麻豆大水煎服

太陽標本病頭痛惡寒下之後胛滿脈促太陽標太陰本相併

桂枝加芍藥湯脉微而遲太陽與少陰相併故加附子

桂枝加芍藥湯

桂枝

生薑

各壹兩半

芍藥

參兩半

大棗

陸枚

痛甚者加大黃

大實痛裏傳表

右咬咀每服五錢水煎服

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝

甘草

生薑

各壹兩半

大棗

陸枚

附子

去皮臍米泔浸

右咬咀每服五錢水煎服

太陽標病脉浮而大頭痛項強八九日如瘧狀熱多寒少不嘔

者無少陽清便自調者裏和也寒熱榮衛俱病故宜

桂枝麻黃各半湯

桂枝

捌錢壹字

芍藥

生薑

甘草

各半兩

大棗

貳枚

麻黃

半兩去節

右咬咀每服五錢水煎服

太陽標病頭痛項強身熱惡寒脉浮而洪過於平脉而自汗不止衛氣不與榮氣諧和刺風池風府整太陽之綱却與桂枝汗又不止形似瘡一日再發非桂枝證也脉洪大者故獨桂枝不愈可與桂枝二麻黃一湯和其榮衛

桂枝二麻黃一湯

桂枝捌錢半

芍藥

伍分半

麻黃

叁錢去節

大棗

貳枚

生姜

伍錢半

杏仁

捌枚浸去皮尖

右剉如麻豆大每服五錢水煎服

太陽病頭痛項強熱多寒少脉微而弱陰脉也熱多寒少有陽明太陽與陽明標併見

桂枝二越婢一湯

桂枝

芍藥

甘草

麻黃

各叁錢叁分

生姜

伍錢半

石膏

半兩

大棗

貳枚

右咬咀每服五錢水煎服

桂枝證或下之頭項強痛發熱無汗心下滿疼小便不利熱不

除宜桂枝湯加茯苓白朮湯

芍藥壹兩半大棗陸枚

甘草

生姜

茯苓

白朮

各壹兩

右咬咀每服伍錢水煎服小便利止後服

太陽標病身熱頭痛項強寸浮尺弱寸浮汗自出尺弱熱自發
陰虛則發熱陽浮則惡寒翕翕發熱爲肌熱鼻鳴乾嘔者裏
和表有病桂枝湯主之

太陽病如瘧頭痛項強發熱惡寒熱多寒少一日三二度發脈
浮微緩者欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可發汗更
下更吐也

如汗下後面反有赤色者未解也不能得小汗出非獨桂枝

證也身痒者榮衛不行可用桂枝麻黃各半湯

太陽經病外證未解脈浮弱者浮者爲陽弱者爲陰法當自汗故宜桂枝湯

太陽病禁下下之後身熱惡風脈浮者表未解脈浮而微者陰也法微喘而爲傷肺下之傷胃故宜桂枝厚朴杏子湯

太陽病身熱惡寒惡風脈浮者表未解下之逆也解表宜桂枝湯

太陽病身熱惡寒惡風脈浮而弱自汗出而不止榮衛不和也宜桂枝湯

太陽病脈浮而弱身熱小便清知不在裏太陽本不病邪在標宜桂枝湯

太陽病頭痛項強身熱發汗則解半日復煩者脈浮數未解也可更發汗宜桂枝湯

太陽病身熱頭痛脉浮而緊無汗醫發汗過多其人又手自冒心心悸欲得按者因發汗多虛故也宜桂枝加甘草湯甘以緩之也

桂枝甘草湯

桂枝

甘草

各壹兩

右咬咀每服五錢水煎服

太陽病脉浮而緊身熱頭痛項背強當發其汗醫妄下之清穀不止身疼痛其脉緊而微當救裏宜四逆湯候身不疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯

太陽病脉浮而弱身熱惡風頭痛項強自汗不止榮弱衛強榮弱者汗自出血不能守而泄於外衛不能護是知榮衛不和也欲救邪風宜桂枝湯

太陽經病頭痛項強身熱不罷者不可下是禁也下之爲逆醫以小發其汗邪氣不越則面色正赤陽氣怫鬱而不得越也

蓋當汗而不汗也故其人躁煩者邪氣不能散也行於經中
乍在四肢乍在腹中按之不能得經一兩次汗解邪氣不除
則致病人短氣但坐者虛也故汗出不徹脉浮而濇故知之
更發汗則愈太陽中風脉浮而緩今反浮而濇者因小發汗
脉濇而緊者身必疼痛當大發汗如尺中弱者不可發汗尺
者陰也弱者陰虛也陰主血虛則尺虛不能作汗故知禁也
病常自汗出榮氣和也不解者衛氣不與榮氣和也脉居榮
衛之中榮衛和則脉平榮衛不和則脉病當和榮衛使脉得
平宜桂枝湯

太陽病苦頭痛者必衄乃邪無從出也宜桂枝湯

太陽標病頭痛身熱項背強脉浮而大法當汗解脉浮大而熱
甚醫又薰之令其汗出病人反煩燥而不解後必清血便血

或衄血皆火邪所致也是謂實實虛虛甚之一也

其脉數者醫又灸之火邪隨經而爲煩逆助陽損陰棄虛而助實流散脉中焦骨傷筋焦骨爲骨蒸傷筋爲筋緩從腰下重者傳陰分也名曰火逆禁之二也

凡病欲解必先煩燥汗欲出也醫又燒針令汗榮衛不和加燒針則寒邪核起而赤不散盛火之氣發腠脉從少腹上衝心痛皆燒針之過也所禁者三也太陽標病薰針灸三禁而發變者宜**桂枝加桂湯**

桂枝

貳兩半

芍藥

生薑

各半

甘草

壹兩

大棗

陸枚

右咬咀每服五錢水煎

太陽病外未除數下之頭痛身熱惡風脉浮而弱醫反數下之此其禁也表證不除脅熱而利邪氣從虛而入其脉尚浮宜

桂枝加人參湯人參甘溫以甘緩之桂辛熱以辛散之甘緩其中辛散其表故宜**桂枝加人參湯**

桂枝

壹兩陸錢

甘草

壹兩陸錢

白朮

人參

乾薑

各壹兩

右咬咀每服五錢水煎

太陽病頭痛身熱惡寒脈浮醫反下之後又發其汗不當下而下心下痞而惡寒脈浮不可攻痞攻之爲逆解表宜桂枝湯表解後攻其痞宜大黃黃連瀉心湯

太陽傷寒頭痛身熱惡寒惡風身疼煩不能轉側者太陽表中風寒濕之氣風則身熱頭痛自汗濕則肢節煩疼軀重故也寒則浮而漚漚則陰盛而患寒宜桂枝加附子湯

太陽標病身熱惡寒風脈浮而緩大便硬屬陽明小便不利太陽本也欲下之其脈浮而緩有太陽表證宜減其辛而加其

甘甘緩其中不發不攻也故桂枝去桂加白朮湯

太陽病身熱惡風項背強而脈浮反下之腹滿痛而利屬太陰
宜桂枝加芍藥湯

如胃中滿痛而實不自利脈浮者當以寒治熱以苦能泄宜

桂枝加大黃湯

桂枝

各三錢

芍藥

壹兩半

甘草

各半兩

大黃

各半兩

右咬咀每服五錢水二盞棗一枚生姜四片同煎

太陰標病腹滿咽乾脈浮者有太陽也當從脈浮治宜桂枝湯
不自利者勿加芍藥

麻黃湯十證方五道

麻黃湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

麻黃升麻湯

太陽尺寸脉俱浮脉從標本桂枝主衛而在表故風則傷衛衛者氣也氣從於表太陽行身之後故先用桂枝寒則傷榮榮者血也血爲有形之說血近於經經有始終榮衛營周不息豈有止也寒邪傷榮脉浮而緊身熱惡寒頭項痛而無汗故終始者爲經以身熱者爲表以浮者爲標故太陽病先桂枝次麻黃麻黃爲瀉表之實

麻黃湯

麻黃

貳兩半

桂枝壹兩

甘草

半兩

杏仁

伍拾个
去皮尖

右剉如麻豆大每服五錢水煎服取微汗

太陽標病身熱頭痛項背強身疼惡風是寒則傷榮脉浮而緊表實無汗而喘者宜麻黃湯

太陽標病頭痛身熱合陽明標發熱不惡風而反惡熱脈浮而長喘而宜瀉不可下當從脈浮而治以麻黃湯解表從太陽也

太陽病頭痛項背強十余日不解脈浮而細胃中滿脇痛者太陽少陽併病與小柴胡湯如脈浮而不細反緊者宜麻黃湯太陽標病身熱惡寒脈浮而緊無汗身疼痛表實榮氣不得泄煩燥必衄宜麻黃湯當汗不汗則衄也

太陽標病脈浮緊而頭痛已發其汗雖漏不止不可行桂枝自汗而喘邪在上焦而無大熱者未傳入裏也宜麻黃杏仁甘草石膏湯石膏之氣清治太陽頭痛甘緩其中杏仁治上焦之喘非麻黃發汗之治也

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃

貳兩

杏仁

貳拾伍个
去皮尖

石膏

四兩

甘草

壹兩

右咬咀每服五錢水煎

太陽標病頭痛惡寒脉浮而緊無汗身疼痛八九日不解者未
經發汗微發其汗小除其煩目瞑劇者邪氣循經上攻頭者
諸陽之會必作衄也陽氣重故耳宜麻黃湯

少陰本病脉沉而遲身熱頭疼背強自太陽所變也當從少陰
治寒淫於內治以辛熱宜

麻黃附子細辛湯

麻黃

細辛

各貳兩

附

壹枚炮去皮臍

右咬咀每服五錢水煎

少陰標本病身涼脉沉頭痛無汗宜微發其汗

麻黃附子甘草湯

麻黃

甘草

各二兩

附子

壹枚炮去皮臍

右㕮咀每服五錢水煎服相次三兩服微汗出止

厥陰標病傷寒陰結不大便六七日大下之結去脉當浮則愈反寸脉沉而遲手足厥冷寸脉沉而遲者少陰本脉故主咽喉不利唾膿血四肢厥者爲厥陰利不止爲太陰爲難治溫之則咽中痛不可溫也宜麻黃升麻湯

麻黃

二兩半

升麻

當歸

各壹兩壹分

知母

叁分

麥門冬

壹分去心

黃芩

叁分

乾姜

芍藥

桔梗

石膏

茯苓

甘草

白朮

各壹分

右㕮咀每服五錢水煎相次一服汗出止

葛根湯四證方三道

葛根湯

葛根加半夏湯

葛根黃芩黃連湯

太陽傷寒中風經与經合尺寸俱長陽明受病當二三日發以
其脉夾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾不得卧陽明經始於鼻
交額中從頭下至足行身之前爲表之裏其陽明經標熱本
實標陽則熱本於胃胃者水穀之海故本實其從標則浮而
長從本則沉而實陽明爲肌肉之本標病身熱蒸蒸而不惡
寒本實胃中燥鼻乾目疼凡凡而熱陽明禁發汗在本者不
禁下發之則變黃證太陽主表榮衛是也榮衛之下肌肉属
陽明二陽併病葛根湯主之衛者桂枝榮者麻黃榮衛之中
麻黃桂枝各半湯榮衛之下肌肉之分者葛根湯又名解肌
湯

葛根湯

葛根

壹兩

麻黃

叁分

桂枝

甘草

芍藥

各半兩

生姜

叁分

大棗

叁枚

右咬咀每服五錢水煎覆取微汗

太陽經病項背強頭痛太陽從上至足几几而無汗肌熱者屬陽明惡風在表也脉浮而過於平脉宜葛根湯

太陽經病頭痛項背強兀兀而熱不惡風目疼鼻乾而利者傳陽明也脉浮大而長傳胃則嘔宜葛根湯

太陽經与陽明合病頭痛項強身熱不惡風脉浮弦不下利陽明本實但嘔者少陽也宜**葛根加半夏湯**

葛根

津兩

麻黃

參二分

甘草

芍藥

桂枝

各半兩

大棗

參枚

半夏

陸錢壹字

右咬咀每服五錢水煎日三

太陽經与陽明標為病頭痛項強身熱鼻乾脉浮大而長當葛根湯解肌從陽明之治也若無陽明脉證獨有太陽脉浮自

汗惡風桂枝湯主之反下之裏虛利不止脉浮大而長者葛根加黃芩黃連湯黃連苦而堅內能止下利黃芩苦寒主表熱裏實是以加之

葛根加黃芩黃連湯

葛根

式兩

黃芩

叁分

甘草

半兩炙

黃連

叁兩

右咬咀每服五錢水煎

青龍湯五證方二道

大青龍湯

小青龍湯

傷寒六經以太陽為始故背為外腹為內背主表腹主裏太陽行身之後為諸陽之表風寒中人先傷於表故外而之內邪中衛者桂枝中榮者麻黃在肌者葛根在筋者青龍去葛根而加石膏便為大青龍無水者不用因水而用之也

大青龍湯

麻黃

冬兩

桂枝

冬兩

杏仁

式十個

大棗

五枚

生姜

半兩

甘草

冬兩

石膏

如半個雞子大

右咬咀每服五錢水煎

太陽經中風頭項強脉浮而緊發熱中風脉當得緩自汗出
今反浮緊無汗而煩躁可解表宜大青龍湯

太陽經傷寒頭項強身不疼但重乍有輕時中風即脉緩宜
大青龍湯

太陽經病身熱頭痛惡風脉浮而滑表不解心下有水氣而嘔
噦者小青龍主之
心下有水氣加細辛乾姜辛而散水五味
子酸收而止渴故宜

麻黃

芍藥

細辛

冬兩

半夏

冬兩

乾姜

冬兩

甘草

冬兩

桂枝

冬兩

五味子

冬兩

右咬咀每服五錢水煎

太陽經病頭痛身熱惡風因飲水而欬者邪在於表因飲水而不消形寒飲冷則傷肺故微喘脉浮而緊宜小青龍湯

太陽經病頭痛項強腰脊強脉浮而緊是傷寒也法當解表反飲冷水內無邪熱不能勝水故停心下乾嘔而欬或渴或噎水停心下或利水氣逆上或小便不利膀胱受濕或喘傷肺宜小青龍湯

柴胡二十證方五道

小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡加芒硝湯

小建中湯

柴胡桂枝乾姜湯

尺寸脉弦者少陽經受病也當三四日發以其脉循脇絡於耳故脅脇痛而耳聾少陽經始於目銳眥終於竅陰從頭下至

足交臆中故脊中痛絡耳則耳聾循脇則脇痛風熱交於目銳眥尺寸俱弦從膽經屬木脉從其本也足少陽本陰行身之側從標陽水之子故發熱從本陰木之母故惡寒前有陽明後有太陽木居於中故往來寒熱治必陽有三禁不可汗不可下不可利小便表解者有高下有淺深皆各不同自桂枝至青龍表解盡也已下有太陽柴胡證與少陽標與經相併所致也三陽自少陽而傳陰陰懼邪而嘔傳陽則寒熱交爭少陽者爲病內不得入外不得出半陰半陽非專辛甘酸苦之藥柴胡黃芩味苦寒而從陰半夏生姜味辛熱而從陽人參甘草大棗味甘和而從中厥陰風木從乎中也主春分之氣也其次有大柴胡從陰者三分之二從陽者一與承氣相近爲表之裏藥也生姜半夏大棗之辛甘發散爲陽裏者

大黃枳實芍藥黃芩柴胡酸苦湧泄爲陰多陰而少陽也故名大柴胡湯陰陽各半故名小柴胡湯

小柴胡湯

柴胡 七兩

黃芩

七兩半

人參

七兩半

半夏

七兩

大棗

二枚

甘草

六兩

生姜

五兩

右咬咀每服五錢水煎

太陽經病頭痛項強脉浮而緊者表病也今反浮細者外已解也浮而細者表已和也設胃滿者少陽經病宜小柴胡湯脉浮宜麻黃湯

太陽經病五六日頭痛項強腰痛脉弦而浮往來寒熱胃滿者少陽也喜嘔者欲傳於裏也宜小柴胡湯

血弱氣盡腠理開邪氣因入與氣分爭往來寒熱休作有時宜小柴胡湯主之

太陽經病頭痛腰脊強身熱過經者六經傳變至十余日先汗而表解後下之後柴胡證仍在大便結而煩脈數者宜

大柴胡湯

柴胡

肆兩

黃芩

芍藥

各壹兩半

半夏

湯洗

枳實

半兩

大黃

半兩

右咬咀每服五錢生姜四片棗一枚同煎以利爲度

太陽經病頭痛項強身熱惡寒脈浮而緊已發其汗而小差過經十三日不解脅滿而嘔者少陽經病也日晡發潮熱者陽明經病也必大便秘宜**柴胡加芒硝湯**

柴胡

貳兩

黃芩

叁分

人參

甘草

各貳分

半夏

陸分

大棗

叁枚

生姜

芒硝

各半兩

右咬咀每服伍錢水煎去滓入硝再煎三二沸溫服

太陽傷寒頭痛項強五六日中風不解往來寒熱非桂枝證而

少陽經病，脅苦滿，嘿嘿不欲食者，傳裏也。心煩喜嘔者，胃虛也。或脅中煩者，邪在上焦也。不嘔者，胃實也。或渴者，裏熱也。或腹中痛者，裏實也。或心下痞硬者，少陽結也。或心下悸動者，裏熱也。或不渴者，裏和也。或微熱，欬者，氣逆也。宜小柴胡湯加減用之。

太陽經病六七日，脈遲陰也。浮弱者，陽虛也。虛則惡風寒，手足溫者，表病也。醫二三下之，裏虛不能實，而脇滿痛，少陽也。面目及身黃者，濕熱也。項強者，太陽經病也。小便難也，衛氣不行也。與小柴胡湯後，必下重，少陰本受濕也。本渴飲水而嘔者，胃虛也。柴胡不中與也。脈遲而不弦者，宜小建中湯。

桂枝

兩

芍藥

兩

甘草

兩

膠飴

半升

大棗

陸枚

生薑

兩

右呖咀每服五錢水煎去滓內膠飴再煎日三夜二尺脉尚遲再作一劑加黃耆末一分

太陽經病傷寒陽脉瀦瀦者陰也陰脉弦者陰也尺寸俱見陰脉也病當腹中痛先与小建中湯止裏表不和者与小柴胡湯和之

太陽傷寒頭痛項強背脇兩痛而嘔者足太陽經与少陽經俱病脉當浮弦日晡潮熱者陽明本也當大柴胡湯下之不得利反自利者知醫用丸藥下之也傷寒之禁故言非其治也潮熱者胃實也先宜柴胡解太陽少陽經病表解則柴胡加芒硝攻陽明之本可也

太陽經病十余日表傳於裏脉須浮熱結於內胃中實痛小便赤澀往來寒熱宜大柴胡湯

太陽經傷寒五六日頭痛項背強脉浮汗出而解復下之裏未實下後胃滿氣痞於上小便清而不利氣結於下反渴陰陽不和也頭汗出者陽動於上往來寒熱表裏不和宜

柴胡桂枝乾姜湯

柴胡

枳實

各二兩

黃芩

各二兩

乾姜

各二兩

甘草

各二兩

桂枝

各二兩

牡蠣

各二兩

右咬咀每服五錢水煎

太陽經病五六日頭汗出者陽動於上微惡寒者太陽本也手足逆冷者傳於內也心下滿大便難不欲食脉細者陽氣結也非少陰也宜小柴胡湯三陰無頭汗故非也

太陽經傷寒汗出不解心下痞嘔吐下利者宜大柴胡湯

陽明經病潮熱鼻乾目疼脉弦而長大便溼陽明本虛也胃滿

不去者少陽經病也故宜小柴胡湯

陽明經中風故身熱鼻乾而嗜卧不得汗陽明也短氣腹滿脇下及心痛少陽也脉弦者少陽也浮者陽明中風也一身及目黃者陽明屬土故色黃結於目也小便難者濕熱在內也有潮熱時時發噦裏實也耳前後腫者濕熱在下也十日已去脉續浮者傳表也當隨證加減而治脉浮而弦者宜小柴胡湯

承氣湯二下七證方三道

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

凡治傷寒須明標本經絡始終陰陽脉象滑瀉浮沉發表攻裏標本逆從邪氣所感而有淺深皮膚腠理肌肉筋骨高下不同瀉痞攻實治皆各異淺者桂枝次者麻黃次附子細辛此

淺深之次也表之裏者小柴胡其次表微裏甚者大柴胡湯
獨裏無表者承氣湯也故發表有淺深攻裏有微甚承氣攻
裏立法有三

大承氣者厚朴苦溫去痞枳實苦寒泄滿芒硝味鹹而能軟
堅大黃味苦寒能泄實痞滿燥實四證全則可用故曰大承
氣湯

小承氣者大黃味苦寒泄實厚朴味苦溫去痞痞實兩全可
用也故曰小承氣湯

調胃承氣者大黃苦寒泄實芒硝鹹寒而能潤燥甘草
和平和其中燥實堅二證全者可用故曰調胃承氣湯此故
裏不同也

大承氣湯

厚朴

壹兩

芒硝

半兩

大黃

半兩 酒浸

枳實

半兩

右咬咀每服五錢水二盞先煮厚朴枳實至一盞後入大黃取六分去滓入硝煎一二沸於溫服以利爲度未利再服

小承氣湯

又名三物厚朴湯 治腹脹脈數 又治消在中爲順氣散

大黃

壹兩

厚朴

半兩

右咬咀煎服同前 若微滿者加用枳實

調胃承氣湯

加當歸爲解毒散 治時氣 疔疽五發瘡瘍喉閉雷頭

甘草

半兩

芒硝

玖分

大黃

壹兩 酒浸

右咬咀煎服同前

加牛旁子寒水石爲末 蜜水調治裏氣大頭病

太陽經病傷寒頭痛項背強發熱自汗小便數者傳陽明也微煩惡寒脚挛急脈浮弱者與桂枝湯得之便厥咽乾煩燥吐逆者外熱而裏寒也作甘草乾姜湯與之汗止榮衛內守更

作甘草芍藥湯與之其脚即伸若胃中氣不和與調胃承氣湯
太陽經病頭痛項強麻黃證已後十三日不解再傳經讖語脉
沉疾宜調胃承氣湯

太陽經病頭痛項強身熱脉浮汗出少與桂枝表過十余日下
溫溫欲吐者胃氣不和也胃中滿少陽經病也大便秘澀者
胃中有濕也腹微滿者氣痞也鬱鬱微煩者裏熱也因自吐
下而得胃中不和宜調胃承氣湯

太陽病解脉陰陽俱停陰脉微者下之解宜調胃承氣湯

太陽經病頭痛身熱脉浮醫以吐下過極又發其汗微煩小便
數者邪氣傳胃也大便秘因硬胃實也脉沉而疾沉爲在裏故
調胃承氣湯利之愈

陽明本病胃中實痛小便赤澀不更吐下心中煩熱者可與調

胃承氣湯

陽明病身熱多熱內亡津液胃中燥大便不通譫語脉沉疾其病心下痞而實痛故宜小承氣湯

陽明經病鼻乾身熱脉長而大因自汗出其脉反沉滑而疾胃中實痛心下痞譫語者宜小承氣湯

陽明經病身熱目疼鼻乾不得卧汗多微熱惡寒脉長而大者表未解也當用葛根湯解表其熱不潮者裏未實也未可與承氣湯若腹大滿不通痞實脉沉疾者可與小承氣湯微和胃氣少與使不大泄如見痞滿燥實者宜大承氣湯

陽明病身熱鼻乾脉長而大其人汗多者津液外出胃中乾燥傳於本病大便硬而譫語者裏實也心下痞者氣不散也脉沉而疾者熱在裏也宜小承氣湯

陽明經病身熱蒸蒸汗出經傳於本也胃中燥實識語潮熱脉滑而疾心下痞者宜小承氣湯因與承氣湯一升腹中轉氣者實欲散也更與一升却不轉者再勿與之氣散故也明日又不大便脉又濡者陰脉也爲難治

太陽傳陽明以大柴胡下之煩燥心下硬不除五六日與承氣湯一升欲泄其實又不大便小便少者得太陽本也雖不能食後自利也但初頭硬者下躁也後攻之必溏者實散也如小便利大便秘硬乃可攻之

陽明經病身熱鼻乾脉當尺寸俱長今反脉遲者汗自出不惡寒無太陽也身重短氣者傳本也腹滿潮熱大便難者胃實也大承氣湯主之

若腹滿不通者痞實也小承氣湯主之

陽明經傷寒鼻乾身熱脈長若吐下不解內亡津液至十余日如見鬼狀大實也微喘直視痞滿也脈反沉疾者在裏也宜大承氣湯

陽明本病讖語潮熱者胃中實熱也不能食者裏燥也宜大承氣湯

二陽併病太陽證罷無表陽明潮熱汗出大便難讖語者宜大承氣湯

陽明經病得之煩熱不得卧自汗出者欲解也復發如瘧狀日晡潮熱脈實者陽明本胃實也宜大承氣湯

陽明經病身熱鼻乾而煩發熱自汗出多者傳本也必胃中燥急下之宜大承氣湯

汗出不解復滿發熱者故知發汗不解也腹滿痛者裏實也

急下之宜大承氣湯下後腹滿減者不足再下也腹滿不減宜大承氣湯

陽明少陽合病必下利脉滑而數者有宿食也當下之宜大承氣湯

陽明經病身熱而煩脉遲不相應也故雖汗出不惡寒非表證也身重短氣腹滿者傳裏也喘而潮熱者外解可攻裏也手足澀澀然汗出者裏實也大便秘者有燥也宜大承氣湯

陽明經病身熱而煩自下血譫語者邪熱入於血室當以小柴胡湯和之但頭汗出者陽明實也刺期門瀉客熱澀然汗出者表欲解也表邪已解脉反沉數者病在裏也故譫語有燥屎在胃中此風燥也。勿令太早須過經早下則變生他病語言必亂神不守也表虛裏實下之則愈宜大承氣湯

少陰經病口燥舌乾而渴者胃中實熱而有痛脉沉而疾者宜大承氣湯

少陰經病口乾燥而渴自利清水心下痛胃實也脉沉而疾宜大承氣湯

少陰經病貫腎絡於肺繫舌本故口乾燥而渴飲水大便難者胃實也脉沉而疾者宜大承氣湯

陷胃湯十二證方二道

三陽下後傳本實

三陽之標與經併而爲表虛本實傳變分部以爲別頭痛而背強身之後鼻乾胃滿身之前脇痛而耳聾身之側此經之病也各有頭痛者經之始也手足沉困者經之終也發熱惡寒者經之表也此邪中三陽之爲病也三陽之表脉俱浮大當以汗解淺深有次其裏未實醫反攻之此爲逆也故脉浮下

之此爲大逆邪氣在標反攻其本本虛則邪氣從虛入而動於膈而作結胃心下硬滿痛或如柔瘕狀或心中懊懣或舌燥而渴或頭痛汗出劑頸而還或水結於心下此皆結胃之病也

太陽標與本經所傳者大陷胃湯標與陽明經所傳者大陷胃九標與少陽經所傳小陷胃湯故三陽下之爲結胃也

大黃苦寒油實而去熱芒硝鹹寒軟堅而潤燥甘遂苦寒破結熱而去水此逆之甚也其變證多

大黃芒硝加葶藶苦寒破結熱而走水泄氣杏仁味辛溫而治上此逆之微也其變少

黃連苦而堅括婁實苦寒而散結半夏辛溫而治上逆之小也凡此三藥加減不同故傳有異也

大陷胃湯

大黃貳兩半

芒硝壹兩捌錢半

甘遂

壹字細末

右以水二盞先煮大黃至八分去滓下硝一二沸下甘遂末溫服

大陷胃丸

大黃

貳兩

芒硝玖分

葶藶

參分

杏仁

壹合去皮尖

右搗羅二味內芒硝杏仁合研如肪如彈丸大一枚抄甘遂末一字白蜜小許水二盞半煮取一盞服一宿乃下如不下再服

小陷胃湯

半夏

陸錢

黃連壹分

括萎實

壹不肆分之壹

右剉如麻豆大以水二盞先煮括萎至一盞半下諸藥取八分去滓溫服未知再服微解黃涎便安也

太陽經病項背強如柔痊狀自汗直視脉寸沉關浮尺弱寸沉無表關浮結胃尺弱陰虛下之宜大陷胃丸

太陽經病頭痛項強反下之心中懊懣邪動於膈故陽氣內陷
心下結硬手不可近者宜大陷胷湯

傷寒六七日結胷熱實脈沉緊心下痛大陷胷湯

太陽經病頭痛項強而發其汗裏未實反下之後五六日不大
便熱結於胷中舌燥而渴潮熱而煩從心下至小腹滿痛不
可近者裏實痛也大陷胷湯

太陽經病頭痛項強脇痛與少陽經併反下之而爲小結胷病
在心下結熱而痛按之痛脈浮滑者皆陽也不可下宜小陷
胷湯

太陽經病頭痛身熱脈浮而數浮則爲風風則傷衛數則爲熱
熱則傷氣動則爲痛動於陽則背痛動於陰則腹痛數則爲
虛而爲陰虛故頭痛微盜汗出者風傷衛也故表未解醫反

下之動數交達邪熱乘入結於胃故膈內拒痛也胃中空虛下之早故也短氣煩燥熱結於內也心中懊懣者煩而不安也陽氣內陷心中結痛而硬手不可近宜大陷胃湯

太陽經病下之太早而爲結胃頭汗出余處無汗者陽往上奔也劑頸而還者熱結於上也小便不利者太陽本病也故身必發黃宜大陷胃湯

太陽病傷寒頭痛身熱解不徹醫爲六日而下之傳爲結胃邪熱拒膈而痛脈沉而緊當心下痛按之石硬者結之甚也宜大陷胃湯

但微汗出者無大熱者此爲水結在胃脇間悶痛宜大陷胃湯太陽經病表未解反下之飲冷水結於胃中非陽也爲寒實結胃故無熱證宜三物小陷胃湯

瀉心湯九證方五道 又十棗湯一方

凡三陰三陽之標本治各不同而發於陽者下之爲結脅謂大
浮數動滑發於陰者下之爲痞氣謂沉澹弱弦微脈同三陰
下之爲痞病皆不同有用寒藥而爲熱痞黃連大黃之類也
有用寒熱藥者陰與陽不和而痞大黃黃連加附子之類有
用辛熱藥多而寒藥少者陰盛陽虛而痞半夏瀉心湯甘草
瀉心湯生薑瀉心湯之類瀉心湯者非瀉心火之熱瀉心下
之痞也通而論之其藥陽多陰少蓋病發於陰而得之有大
黃黃連瀉心湯獨爲陰心下痞而脈疾一證桂枝後用從太
陽浮弱所變余者皆陰陽雜用

大黃黃連瀉心湯

大黃

黃連

各貳兩

甘草

壹兩

右劉如麻豆大沸湯一盞熱漬之一時久絞出滓煖動分服

附子瀉心湯

大黃

黃連

黃芩

各壹兩

附子

壹枚炮去皮臍煮汁用

右劉如麻豆大沸湯一大盞熱漬之一時久絞出滓內附子汁分溫再服

半夏瀉心湯

半夏

貳兩

黃連

半兩

黃芩

人參

甘草

各壹兩

大棗

陸枚

乾姜

壹兩半

右劉如麻豆大每服五錢水二盞煮至八分去滓溫服

甘草瀉心湯

甘草

貳兩

黃芩

乾姜

各壹兩半

半夏

壹兩

大棗

陸枚

黃連

人參

各半兩

右劉如麻豆大每服五錢水煎

生薑瀉心湯

生薑

壹兩

黃芩

各壹兩半

人參

壹兩

乾姜

半兩

半夏

壹兩

黃連

半兩

大棗

陸枚

右剉如麻豆大每服五錢水煎

太陽經病頭痛惡寒六七日嘔而發熱皆經病也宜柴胡湯服藥蒸蒸而發汗出不解者表解心下有痛者爲結胃熱結於內也如滿而不痛爲痞氣發於陰而得宜半夏瀉心湯柴胡後變心下痞按之軟者脉疾者宜大黃黃連瀉心湯心下痞而惡寒汗出脉沉者附子瀉心湯發於陰陽而得心下痞瀉心湯不解者氣不降也與五苓散非太陰不用瀉心湯太陰主痞滿也

傷寒汗後胃中不和心下痞不發熱而身涼宜生薑瀉心湯

太陽中風反下之心下痞醫反覆下之痞益甚脉浮而微痞者氣疾也宜甘草瀉心湯

太陽經病頭痛惡寒此太陽傷寒反下之後復發其汗不解心
下痞而惡寒脉浮者不可攻痞表未解也當先解表宜桂枝
湯惡寒脉浮已解表和也可攻痞宜大黃黃連瀉心湯
太陽經病頭痛發熱太陽也嘔者少陽也脉浮而弦柴胡證具
也以他藥下之柴胡證仍在未解也復與柴胡湯雖下後不
爲逆

太陽經病表解其人熱熱汗出發作有時頭痛心下痞硬滿引
脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者宜十棗湯

芫花

炒赤熬

甘遂

大戟

各等分

右各另爲末合和入臼中再杵二三次下先以水一升半煮
肥棗十枚擘破煮取八合去滓內藥末強一錢匕羸弱人半
錢單飲棗湯送下平日服若下少病不除者更服加半錢利

後米粥日養合下不下令人腹滿脹通浮腫而死

太陽病汗出表解心下痞硬乾噫食臭者胃氣不和也脇下有
水腹中雷鳴寒氣之變也下利者裏寒也宜生薑瀉心湯
太陽中風在表反下其人下利日數十行者脾胃虛也穀不化
腹中雷鳴者裏寒也心下痞而乾嘔煩者胃中虛客氣上逆
故痞硬也宜甘草瀉心湯

抵當六證方三道

夫傷寒變證不同而各有法在標者治之標無汗之過在本者
治之本無下之過故治有標本用有逆從今之醫者邪在於
標而治其本傳之爲結背痞氣或爲畜血邪在本而治其標
則鼻衄而發黃或爲溫毒或爲癰疹故諸變不可勝數也太
陽之本膀胱是也有出無入上傳道行氣之府氣化則能出

入邪在太陽或小便自利反利其小便熱隨氣行蓄血於內故有桃仁承氣湯抵當丸抵當湯三藥之變太陽標與陽明變桃仁承氣湯太陽標與少陽陽明變抵當丸太陽標本變抵當湯陽明標與太陽本變亦有抵當湯此血證傳變之法也水蛭味鹹苦寒鹹能勝血苦則入心育虫味苦微寒而能破畜血桃仁味苦甘能破血大黃味苦寒能泄實而去熱故有少陽之輕治抵當丸水蛭育虫各倍大黃三倍桃仁亦多於方故有太陽之重治抵當湯桂枝甘草爲表藥大黃芒硝爲裏藥桃仁散血故從太陽陽明之實治也抵當丸

抵當丸

水蛭

育虫

各五个

桃仁

八个

大黃

五两

右爲細末只一九以水一大盞煮一九至七分頓服晡時當下血愈不下更服**桃仁承氣湯**

桃仁

个十

大黃

乙兩

桂枝

乙兩

甘草

乙兩

芒硝

各半兩

右剉如麻豆大以水二盞至八分去滓下硝煎化溫服未利

移時再服

抵當湯

水蛭

个十

黃虫

个十

大黃

乙兩

桃仁

个十

个十

右剉如麻豆大作一服以水二盞煎至八分去滓溫服

太陽經病頭痛身熱不解便利而赤者熱在膀胱也大便秘狀

如豚肝者有血也其人如狂者熱結膀胱也宜桃仁承氣湯

太陽經病頭痛身熱未解也反小便利而利脉沉數者邪氣

下入膀胱畜血於內其人發狂者熱在下焦少腹滿痛下血

則愈宜抵當湯

太陽經病頭痛身熱法當汗解反利小便熱瘀於內則身黃脉

沉沉爲裏少腹硬小便自利其人如狂者下焦有血血證諦

也宜抵當湯

傷寒有熱表也少腹滿當小便不利結熱於內也今反利者有血也宜抵當丸

陽明經病身熱而煩喜忘者血氣失度神無所養故喜忘也大便秘黑者畜血於內也抵當湯下之

陽明病表已解發熱而脈數者可下之假令已下不大便者有瘀血抵當湯凡辨血證其法有三小便自利一也大便秘色二也狂言見鬼小便淋者三也

梔子湯五證方二道

傷寒發表攻裏之後傳變不同下之早而有結實痞氣結胸者邪氣結而實痞氣者邪氣痞而虛虛實之間邪在胸中與正氣相搏懊憹而煩不得眠者宜梔子湯大抵不得眠者從陽

明所得太陽中所有梔豉湯者自太陽而傳陽明也謂之曰太陽梔豉湯陽明有梔豉湯者本經自傳而得之者也

梔子豉湯

肥梔子

肆枚 香豉 半兩

右以水二盞先煮梔子至一盞內豉同煮至七分去滓溫服
太陽經病頭痛身熱惡風發汗解表頭痛止而身熱不去大下之裏有熱虛邪傳於心中懊懣不得眠心中結痛者梔子豉湯

太陽傷寒未當下反以丸藥下之身熱不除邪氣內傳心中煩而不得眠者**梔子乾姜湯**

梔子

肆枚 乾姜 半兩

右剉如麻豆大水一大盞煮至七分去滓溫服

陽明經病鼻乾不得眠卧脉浮而緊在表也咽乾口苦者少陽

也腹滿而喘傳裏也汗出惡熱表未解也若下之則胃中空虛邪氣乘虛而入客氣動膈心中懊惱不得眠宜梔豉湯

發黃四證方三道

傷寒傳變發黃者四有畜血發黃自太陽傳本也有結胸發黃下之早故也有濕熱發黃太陽經傳陽明本也有寒濕發黃少陽與太陰也大抵發黃多從陽明太陰脾胃屬土故色黃土勝則剋水使小便不利濕熱內變故令發黃陽明者茵陳蒿湯兼太陽者麻黃連翹赤小豆湯兼少陽梔子蘘皮湯

茵陳蒿湯

茵陳蒿

壹兩半

大黃

伍分

梔子

拾枚

右剉如麻豆大每服一兩水三盞先煮茵陳減一半內二味煮八分去滓溫服日三小便當如皂角汁則黃出矣

陽明經病身熱鼻乾頭汗出陽往上奔小便赤而不利濕熱發黃宜茵陳蒿湯

陽明病身熱不去七八日身黃如橘色小便赤澀而不利宜茵陳蒿湯

太陽陽明身熱不去瘀熱在裏身必發黃小便微利宜麻黃連翹赤小豆湯

少陽陽明身熱不去小便自利而煩者身必發黃宜梔子蘘皮湯

麻黃 連翹各壹兩 赤小豆

右剉如麻豆大每服一兩水三盞煎至八分去滓溫服

梔子蘘皮湯治燥熱發黃

大黃 蘘皮各貳兩 梔子拾伍个

右判如麻豆大每服一两水三盞煎服發黃大便自利不止者加黃連黃蘗各三兩工減大黃用之多効

五苓散十五證方七道

太陽證發於標者汗而解之發於裏者攻而利之病在太陽渴而飲水者熱結膀胱也膀胱者傳導汗氣之府故有熱則多渴而煩小便不利宜五苓散是太陽入本藥也

五苓散

太陽

豬苓

半兩

澤瀉

壹兩

白朮

叁分

茯苓

伍分

官桂

半兩

右爲細末每服抄三錢白湯調下

白虎湯

陽明

石膏

肆兩

知母

壹兩

甘草

貳兩

粳米

壹合

右判如麻豆大每服五錢水二盞至八分米熟爲度

猪苓湯

少陰

猪苓

茯苓

阿膠

澤瀉

滑石

各半兩

右剉如麻豆大水二盞煮至八分去滓內膠消盡服

太陽證寸緩者浮緩也當汗惡寒閉浮者當心下有痞也尺弱者醫下之過而虛其陰故有此脉如不下病不惡寒汗出而渴者轉屬陽明也陽明主胃胃中熱則小便數大便硬也不更衣十日無所苦者不知人也渴欲飲水少少與之法當救渴宜五苓散

太陽經病發汗後大汗出表解也津液內少胃中乾燥而不得眠故欲飲水小便不通水無所歸也宜五苓散

發汗已脉浮數煩渴者宜五苓散

太陽中風發熱當以汗解六七日不解熱傳於裏故有表裏證

也熱欲飲水傳裏也水入則吐水不能散也故名水逆宜五
苓散

太陽病發汗後表解其人臍下悸者邪氣內結欲作奔豚當散
之宜**茯苓桂枝甘草大棗湯**

茯苓

各三兩

桂枝

各三兩

甘草

半兩

大棗

肆枚

右剉如麻豆大以甘瀾水二斗先煮茯苓減五斗下諸藥
煮取七合溫服

太陽經傷寒若吐邪在上焦若下邪在裏也吐下後不愈非其
治也心下逆滿者下之過也氣上衝膈起則頭眩者吐之過
也脉沉緊者發汗動經浮緊當汗沉緊不當汗故汗則動經
身爲振搖宜**茯苓桂枝白朮甘草湯**

茯苓

壹兩

桂枝

壹兩

白朮

各壹兩

甘草

各壹兩

右判如麻豆大每服五錢水二盞至八分服

太陽經病傳裏未實醫反吐下之不解熱結於內而惡風脉浮

者邪在上也

白虎加人參湯

陽明

石膏

肆兩

知母

壹兩

炙甘草

壹兩

粳米

壹合

人參

伍分

右判如麻豆大每服五錢水煎取米熟爲度

傷寒表解無大熱口渴渴背微寒脉浮者邪在上也白虎加人

參湯

太陽病頭痛背強發熱無汗脉浮當解表未解者無白虎證如

表解後渴者白虎加人參湯

太陽經病反下之脉浮者不結胃浮在關者結胃也浮者陽也

故使然也脉緊者必咽痛脉浮而緊者上焦實也故必咽痛

弦者必兩脇拘急弦者少陽行身之側故兩脇拘急脉浮細

而數者邪在表故頭痛未止脉沉緊者必欲嘔胃虛寒脉沉滑者脇熱也沉爲在裏滑者爲陽陽隨陰轉故多脇熱在裏而爲利脉浮而滑者浮爲陽滑爲陽二陽脉併則爲下血爲熱病也病在陽當以汗解各隨脉證治皆不同在表當汗反以水濕之若灌之使表熱不能出邪熱弥更而反煩燥肉上粟起意欲飲水煩燥反不渴裏未熱也宜文蛤散若不差者宜與五苓散

陽明經病發熱脉浮而渴欲飲水者陽明中熱也小便不利者太陽本病也宜猪苓湯

太陽陽明與少陽爲三陽合病故腹滿身重難以轉側者傳裏也口中不仁者罵詈不避親疎也譫語遺尿者膀胱不禁也不可發汗發汗則譫語不可下下則額上汗出也手足逆冷

自汗出者熱厥在裏也宜白虎湯

厥陰傷寒脈滑而厥者渴者裏有熱也宜白虎湯

乾姜四逆湯十五證方七道

乾姜附子湯

甘草附子湯

四逆湯

芍藥甘草附子湯

附子湯

吳茱萸湯

通脈四逆湯

太陰本病論

尺寸俱沉細者太陰受病也太陰標本俱陰故脈沉者陰細者陰也是從標本故緩也脾藏當緩不緩是不從五行而從標本其經始於足大指隱白從足上行至腹布胃絡盛在經之爲病腹滿噎乾自太陽中風反下之利不止傳入太陰之本腹滿時痛宜桂枝加芍藥如腹滿而實痛者桂枝加大黃此

一證從太陽傳變而來也

少陰本病論

少陰脉尺寸俱沉標本俱陰其經始於足心循腹上行繫舌本貫腎絡肺故口燥舌乾而渴爲經病也身寒自汗四肢挛小便清腹滿惡寒脉沉而微此少陰本病也當溫之宜附子輩治少陰乃以熱治寒皆少陰本藥也

乾姜附子湯

乾姜 壹兩炮 附子 壹个炮去皮臍

右咬咀每服伍錢水煎

少陰病脉沉而微本寒也宜乾姜附子湯

發汗病不解反惡寒者虛故也小便清大便依度腹痛者皆宜

芍藥甘草附子湯

芍藥

甘草

各叁兩

附子

壹个炮去皮臍

右咬咀每服五錢水煎

太陽病傷寒頭疼項強當發其汗反下之清穀不止裏寒也一身疼痛者表寒也急當救裏者先治其本宜四逆湯從少陰本也穀氣裏和外身疼痛後治其表宜桂枝湯

四逆湯

甘草

壹兩

乾姜

柒分半

附子

半個炮

右剉如麻豆大水二盞煎至七分去滓溫服

太陽經與表感風濕之氣相搏骨節煩痛者濕氣也溫則關節不利故疼掣而不能屈伸者風也汗出身寒脉沉微短氣小便清而不利者寒閉也惡風者表虛也或微腫者陽氣不行也宜**甘草附子湯**

甘草

壹兩

附子

壹個炮

白朮

壹兩

桂枝

叁兩

右剉如麻豆大每服五錢水煎溫服汗出即解

陽明今病身熱鼻乾脉浮而遲遲則爲寒表熱而裏寒清穀下利宜四逆湯

太陰病腹痛脉浮者太陽也故宜枝枝湯自利不渴者裏寒也屬太陰脾本藏寒也脉沉而細當溫之宜四逆輩

少陰病足腫寒躄重痛手足冷而逆骨節疼脉沉者本病也宜

附子湯

附子

一个炮

茯苓

人參

各一兩

白朮

式兩

芍藥

一兩半

右剉如麻豆大每服五錢水煎服日三

少陰本病身寒脉沉遲口中和背惡寒四肢冷小便清者宜附子湯

少陰病足腫寒如洩小便清吐逆者裏寒也寒多不下食手足逆冷表寒也煩燥欲死者陽虛也宜**吳茱萸湯**

吳茱萸三兩半

人參七分半

生薑

一兩半

大棗三枚

右剉如麻豆大每服五錢水煎溫服

少陰病下利清穀裏寒外熱手足逆冷脈微欲絕惡寒或利止

脈不出宜

通脈四逆湯

甘草二兩炙

附子大者一個炮

乾姜

三兩炮

右剉如麻豆大每服五錢水煎服未差再服

面赤者加連鬚葱白五莖

腹中痛者去蔥加芍藥二兩

嘔者加生薑二兩

咽痛者去芍藥加桔梗一兩

脈不出者去桔梗加人參二兩

少陰病足脛寒腫四肢冷其人或咳者肺寒也乾嘔者胃虛也

小便清而不利者寒閉也腹中痛者腎病也或瀉下利者寒在下焦也故曰宜四逆湯

少陰病足脛寒食入則吐裏寒也心中溫溫欲吐者胃虛也復不能吐者肝氣也始得之手足寒脉弦而遲者腎肝也胷中實不可下陰氣在上也當吐膈上寒飲欲嘔者不可吐寒在上焦故不可吐也當溫之宜四逆湯

諸變證方一十四道

厥陰病手足厥冷自汗小便清而利脉細欲絕者厥陰也宜

當歸四逆湯

當歸

桂枝

芍藥

細辛 各一兩

甘草

通草

陸氏七分半

右剉如麻豆大每服五錢水二盞棗一枚煎至八分去滓溫服

厥陰病四肢滿悶大汗出熱不去者虛陽之氣也內拘急腹中痛下利氣逆於上惡寒厥逆脉細而微者宜四逆湯

厥陰病四肢拘急大汗出而下利者表裏俱寒者也其脉細而厥宜四逆湯

厥陰病傷寒厥陰本自寒下醫復吐下之胃中虛寒故食入吐

脉細而微乾姜黃芩黃連人參湯

乾姜

黃芩

黃連

人參

各七分半

右剉如麻豆大水煎溫服

厥陰病四肢拘急下利清穀裏寒外熱也汗出而厥者表虛也脉細而絕者陽氣衰也宜通脉四逆湯

厥陰病四肢拘急傷寒脉滑者爲陽脉也故言裏有熱白虎湯主之手足厥逆脉細欲絕者當歸四逆湯主之

厥陰病四肢拘急而嘔脈弱皆陰病也小便復利者裏虛也身微熱見厥者不相應也故爲難治宜四逆湯

厥陰病四肢厥逆脈細而微內傷寒邪胃中無食而虵厥時靜時煩爲之藏寒虵上入膈時時煩也得食而吐虵者聞食氣而上出也宜烏梅丸

烏梅葉拾伍个細辛

乾姜

附子

蜀椒

黃蘗

各壹兩半

黃連

四兩

當歸

壹兩

人參

貳兩半

桂枝

去皮壹兩半

右十味異擣篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升米下飯熟杵成泥和藥令相得內臼中與蜜同杵二千下丸如桐子大先食飲服十九日三服稍加至二十九禁生冷滑物等

厥陰病七八日膚冷者表寒也病人躁無暫安者此爲藏厥非

蛇厥也藏厥者藏寒也宜四逆湯

其人常自吐蛇者亦蛇厥也宜烏梅丸

厥陰病四肢厥冷脉乍緊心下滿而煩者寒實在胃而煩也宜

吐之以

芩帶散

芩帶

壹分

赤小豆

右搗篩已合治之取一錢豉一合湯七分令先漬之須臾煮作稀糜去滓取汁和散頓服不吐少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與之

厥陰病四肢拘急心下悸裏有水宜先治水以**茯苓甘草湯**

茯苓

生薑

各二兩

桂枝

炙甘草

各二兩

右剉如麻豆大每服五錢水煎溫服

厥陰病四肢拘急內傷寒物下利日十余行脉反實者脉病不相應也故死下利欲飲水者有熱故也脉當實宜白頭翁湯

白頭翁湯

白頭翁

半兩

黃蘗

秦皮

黃連

各柒分半

如剉如麻豆大水二盞每服五錢煎服不差再服

傷寒陽脉瀋陰脉弦寸瀋者陰也陰脉弦者肝脉也未能剋土

法當腹中痛當補脾胃先與小建中湯不差與小柴胡湯

太陽傷寒當解表服下藥利不止心下痞者脾胃虛也當與理

中丸和之利益甚者邪在下焦也宜**赤石脂禹餘糧湯**

赤石脂

禹餘糧

右剉碎每服五錢水煎溫服

服藥後利不上者邪在太陽之本故當利小便却與禹餘糧

湯則愈

理中丸

人參

叁兩

乾姜

甘草

白朮

各壹兩

右爲細末煉蜜爲丸如鷄黃大以湯數合和丸碎研溫服日
三腹中未熱益至三四丸煎熱粥飲之

太陽中風自汗出醫反發其汗必恍惚心亂以虛而反又一虛
之則心神虛而恍惚小便已陰痿氣虛也宜禹餘糧湯

太陽傷寒頭痛當以藥發其汗而解醫反以火迫劫之而亡陽
必驚狂起卧不安者火邪內變也宜桂枝去芍藥加蜀漆牡

礪龍骨救逆湯

桂枝

生姜

蜀漆

各壹兩半

甘草

壹兩

牡礪

貳兩半

龍骨

貳兩

大棗

陸枚

右剉細每服五錢水煎溫服

病如桂枝證頭痛項不強身熱自汗當與桂枝湯服藥後未解
寸脈浮滑中痞故寸爲上部滑中痞者膈上病也氣上衝不

得息者邪結在上也此爲胃中有寒宜吐之以芫帶散
太陽經病欲傳少陽必自利傳裏也宜茯苓湯
若嘔者少陽也宜黃芩加半夏生姜湯

黃芩湯

黃芩

半斤

芍藥

甘草

炙各五錢

大棗

參枚

右剉細每服五錢水煎溫服

太陽經傷寒傳裏脅中有熱胃有邪氣傳陽明本也腹中痛欲嘔者熱在內也宜**黃連湯**

甘草

黃連

乾姜

人參

各半斤

大棗

參枚

右剉細每服五錢水煎服

傷寒發表攻裏後又吐下之表解後心下痞硬噫氣不除寒熱不交則氣噫而不除宜**旋覆代赭湯**

旋覆花

比示分半

人參

半兩

生薑

乙兩

代赭

貳錢半

甘草

半兩

半夏

貳錢

大棗

貳枚

右剉細分三服水煎溫服

諸雜證方十二道

傷寒少陰經絡於肺繫舌本邪在膏結於咽喉中痛而不利或爲失音白通豬膽汁甘桔苦酒之類皆少陰之經藥也非少陰本藏之藥也脉皆浮弱是以膈上至頭之有疾雖在上部之法亦少陰也

傷寒病在裏當下麻仁丸蜜導煎土茱根豬膚湯之類非熱氣在胃而實脾約中燥而結趺陽脉浮而濇脉浮而無力下之而弱雖當下之不可使用承氣何也內陰結故也下之則損胃傷陽故當潤而通之勿令損氣察脉之虛實勿令悞也

傷寒六經發表攻裏標本逆從各有高下不同輕重亦異如少陰之標本病也當溫之以附子四逆湯輩同太陽麻黃桂枝之法如桃花湯禹餘糧湯龍骨牡蠣救逆湯輩皆重泄之藥旋覆代赭乃輕重之藥同太陽大柴胡承氣輩草輕石重者皆少陰本藥沉墜於下也

陽明經病自汗出醫又發其汗小便當不利今反自利津液內竭也雖大便秘乾燥不可攻之宜蜜煎導而通之若土苳根豬膽汁皆可爲導

蜜煎導

蜜四兩

右一味內銅器中微火煎之稍凝如飴狀撓之勿令焦捻作錠子如指長二寸當熱時急作令頭銳內穀道中欲大便去之

豬膽汁方

大豬膽去脂瀉汁和法醋少許以灌穀道中如一食頃當大便
太陽經病反小便不利者熱結膀胱也大便乍難乍易者胃中
有微熱也宜大承氣湯下後食穀欲嘔者屬陽明胃虛也宜
吳茱萸湯

趺陽脉浮而濇小便數趺陽者胃脉也足趺上衝陽是也脉當
浮緩今反浮濇者雖小便數大便硬非沉數不可下浮濇者
脾約也故宜**麻仁丸**

麻仁

半升

芍藥

貳兩

厚朴

貳寸半姜製

枳實

貳兩半
麩炒

杏仁

貳合半去皮尖

大厚

肆兩去皮

右爲散蜜和丸如桐子大飴飲下十九丸未知益加之

少陰本病二三日至四五日腹中痛者有大陰也小便不利者

大陽本也便膿血者少陰本受溫也宜**桃花湯**

赤石脂

肆兩

粳米

乙合半

乾姜

三錢半

右以水二盞煮二味半熟去滓內赤石脂細末方寸匕溫服

少陰病下利咽痛者少陰也實滿心煩者有熱也宜**豬膚湯**

豬膚

四兩

右一味以水二大盞半煮至一盞二分去滓加白蜜二兩半

白粉一合三兩半

少陰病二三日咽喉痛者少陰繫於舌故咽痛也宜甘草湯不

差與桔梗湯

甘草湯

甘草

壹兩

右剉細每服五錢水二盞煮至六分去滓溫服日三加桔梗

一兩便爲桔梗湯

少陰經病咽中生瘡不能言語聲不出者宜**苦酒湯**

半夏

洗大者肆拾个 鷄子壹个去黃內苦酒著外殼中

右半夏著苦酒中以鷄子殼置刀鐮中安火上令三沸去滓少少嚥之

少陰病下利脉微宜**白通湯**

附子

壹个生用

乾姜

壹兩

右剉細每脉五錢入葱一寸水煎白通服後

利不止厥逆無脉乾嘔者少陰本病也宜**白通加猪膽汁湯**

附子

壹个去皮臍分捌片只用貳片

乾姜

貳分

葱白

壹莖

猪膽

貳合半

猪膽

肆分之壹

右爲末水一大盞煮至五分去滓內猪膽汁和調相得溫服少陰經病至四五日腹痛者裏有濕也小便不利四肢沉重者

真武湯

裏寒也疼痛者裏有水也或欬者氣逆於上也或小便不利者濕毒在內也或下利者脾氣盛也或嘔者胃氣虛也宜服

芍藥

貳兩附子

壹个炮去皮臍

生姜

半斤

白朮

伍分

茯苓

壹分

右剉細每服伍錢水二盞煮至八分去滓溫服日二

效者加五味柒錢半

細辛二錢半

少陰病二三日已上經病日去心中煩不得卧者少陰本受熱也宜黃連阿膠湯

黃蘗

乙兩

黃連

貳兩去皮微炒

阿膠

壹兩

梔子

仁半兩

右爲細末每服四錢水二盞煎服

病人手足厥冷者厥陰本病也脉乍緊者爲寸脉緊也心下滿

而煩者邪在膏中也宜葠藶散

厥陰傷寒心下悸者內傷冷水結於心下故悸也宜茯苓甘草湯

痊濕暍十六證方十二道

痊證

夫傷寒痊濕暍者風濕熱也風氣感而重者爲之痊濕氣感而重者變爲發黃暑氣感而重者爲之暍太陽表與經傷寒中風相似太陽陽明所致也

太陽經與標病發熱無汗惡寒者表實也頸項強而脈浮結背

反張多剛痊宜麻黃加獨活防風湯

方在按摺下難知肉

太陽經與標病發熱者標也自汗者表虛也項背強而脈浮弦

者桑葉也宜桂枝加川芎防風湯

方在下難知中

太陽標病發熱者在表也脈反沉細者附大陰也沉爲不細

者必腹痛宜桂枝加芍藥防風湯

方在下難知中

太陽經與標病因發汗過多榮氣內虛不能榮於筋風氣變動

故口噤因汗多而傳陽明也陽明經俠口環唇背反張者太

陽病身之後爲所生病宜去風養血防風當歸散

方在前冊難知中

傷寒汗下後不解乍靜乍燥目直視口噤往來寒熱脉弦者少

陽風瘥也宜小柴胡加防風湯

方在下難知中

濕病

太陽經與標有濕氣榮衛俱病也關節煩疼而小便不利脉沉

細者濕氣在內也屬太陰故小便不利大便反快宜勝濕利

小便五苓散猪苓湯

太陽標病一身盡痛者表也身如薰黃者陽明脾胃相傳之變

也茵陳蒿湯

濕家病者太陰也頭汗出背強欲得覆被向火者本陰也勿下之下之早則爲痞氣乃胃冷則爲噦胃滿小便不利舌上白胎者陰陽反作也寒反在上則舌上白胎熱反在下則小便不利故曰丹田有熱膏中有寒渴欲飲水者丹田有熱也得而不能飲者膏中之寒也故不治爲關格病也

濕家下後陰陽和額上無汗上焦和也小便利者下焦治也故生如下後小便不利額上汗出不止微喘陰陽相離故死也太陽表病風濕相搏榮衛俱病一身盡瘰表氣不和當汗而解之風隨汗出值天陰雨不止濕氣不除後微發其汗風濕皆去也宜麻黃加葛根湯

杏仁

二十五個去皮尖大

麻黃

桂枝

葛根

各二兩

甘草

半兩

右剉細每服五錢或一兩水三盞煎至五分去滓溫服

濕家一身盡疼發熱面黃而喘頭重鼻塞而煩其脉沉
食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞而煩內藥鼻中則愈

喝病

太陽中熱者喝是也汗出惡寒者在表也身熱而渴者在上焦
焦也宜白虎加人參湯頓服之

太陽中喝者身熱而煩汗欲出反飲冷水噎之汗不能出水行
皮中而脉微弱表有水也當發其汗宜升麻湯

升麻

葛根

芍藥

甘草

各一兩

右剉細每服一兩水三盞煎服

太陽中喝者發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細訖遲小便已洒
淅毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發汗則
惡寒甚加溫針則發熱甚數下之則淋甚何也爲脉弦細訖

遲此 禁也齒乾者牙乃骨之精今燥者骨熱也針藥不能
治當灸大杼穴

論傷寒霍亂并治

夫傷寒霍亂者其本於陽明胃經也胃者水穀之海主稟四時
皆以胃氣爲本與脾藏爲表裏皆主中焦之氣腐熟水穀脾
胃相通濕熱相合中焦氣滯或因寒飲或因飲水或傷水毒
或感濕氣冷熱不調水火相干陰陽相搏上下相離榮衛不
能相維故轉筋掌痛經絡亂行暴熱吐瀉中焦胃氣所主也
有從標而得之者有從本而得之者有從標本而得之者六
經之變治各不同察其色脉知犯何道隨經標本各施其治
此治霍亂之法也

傷寒吐瀉轉筋身熱脉長陽明本病也宜和中平胃散建中湯

或四君子湯

方在下難知中

脉浮自汗者四君子加桂五錢主之

脉浮無汗者四君子加麻黃五錢主之

傷寒吐瀉轉筋者脇下痛脉弦者木剋土也故痛甚平胃散加

木瓜五錢亦可治宜建中加柴胡木瓜湯

方在下難知中

傷寒吐瀉後大小便不通胃中實痛者四君子加大黃兩主之

傷寒吐瀉轉筋腹中痛脉重脉沉而細者宜四君子加芍藥高

良薑湯

方在前難知中

傷寒吐瀉四肢拘急脉沉而遲此少陰霍亂也宜四君子加姜

附厚朴湯

方在前難知中

厥陰霍亂必四肢厥冷脉微緩宜建中加附子當歸湯

方在前

難知中

雲岐子保命集論類要卷上

